

La FDSEA mobilisée pendant le confinement

Durant cette longue période de confinement, toute l'équipe de la FDSEA a poursuivi son travail pour défendre et accompagner les agriculteurs breilliens. Par la diffusion d'informations en premier lieu. L'arrivée brutale du confinement a fortement inquiété les agriculteurs quant à la poursuite de leur activité. Les élus de la FDSEA ont participé à de nombreuses réunions de crise avec la préfecture pour assurer la continuité de l'activité de toute la filière : fournisseurs, ETA, transformateurs, abatteurs... Les dégâts de corvidés et de sangliers ont mobilisé aussi les élus lors des réunions avec l'administration. Les semis de maïs n'ont pas attendu le déconfinement et les dégâts non plus. Il fallait pouvoir intervenir partout sur le territoire pour limiter l'impact des destructions. Quelques difficultés particulières sont apparues dans certaines productions mais des solutions ont toujours été trouvées rapidement pour les horticulteurs, les producteurs en vente directe, ou encore pour faire repartir les cueillettes à la ferme. Parce que les déclarations PAC n'ont pas attendu la fin de l'épidémie, l'équipe de la FDSEA a assisté de nombreux agriculteurs dans leur déclaration, à distance, pour ne pas prendre de retard et que les paiements ne soient pas affectés à l'automne.

FL Dallage

(applicateur béton)



Exemples :

- Stabulation
- Fumière
- Fosse silo
- Stockage
- Poulailler... etc

Finition :

Surfacé hélicoptère, balayé, brut

Tél. 06 26 39 17 07 • E-Mail : fldallage@gmail.com

Le système de traite de Dominique réalise les constats de gestation et détecte les chaleurs

Comment transformer le meilleur robot de traite jamais produit ? Ajoutez la possibilité de réaliser des constats de gestations automatisés et de détecter les chaleurs durant la traite. Cela s'appelle le DeLaval VMS™ V310 - et c'est une véritable révolution. Parlez-en à votre concessionnaire pour en profiter vous aussi.



NOUVEAU
DeLaval VMS™ V310



www.delaval.com
@ : info.fr@delaval.com



61 route de Vitré
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
Tél. 02 99 96 21 50

Conseils de saison

→ Sur maïs, on observe beaucoup d'attaques d'oiseaux cette année, qui nécessiteront des re-semis

Faites les déclarations en ligne sur le conseil cultures BZH. Aussi quelques symptômes ponctuels de *geomyza* : aspect poireau, feuille centrale desséchée et/ou oscinies : feuille centrale en anse de panier, qui a des difficultés à sortir du cornet... à suivre jusqu'à 10 feuilles. Mais il n'y a pas de solution curative.

→ Les plantes de maïs sont autonomes en alimentation (vis-à-vis de la graine) à partir de 5-6 feuilles

Dans cette période sèche, attention à la concurrence à l'eau : ne pas louer le désherbage. On voit pas mal de parcelles où le ray-grass s'est repiqué (dérobées ou prairies pas suffisamment dégradées), n'hésitez pas à faire un binage (+ buttage à 8-10 feuilles) tant que les conditions sont sèches. En l'absence de pluies depuis le 10 mai, le désherbage mécanique se poursuit d'ailleurs, en particulier dans les actions bassins versants. Contactez vos conseillers.

→ Le réseau de suivi des vols de pyrales commence cette semaine

Consultez-le dès jeudi. Les risques sont plus élevés, si les cannes n'ont pas été broyées en monoculture de maïs, si des dégâts ont été observés l'an dernier. Avec les températures élevées, les 1ers vols pourraient être plus précoces que d'habitude, moment où il faut déposer les trichogrammes... À suivre.

→ Mes génisses sont-elles contaminées par des strongles ?

Les parasites les plus fréquents au pâturage sont les strongles digestifs et pulmonaires. Les strongles digestifs se manifestent par un retard de croissance, un amaigrissement, des diarrhées. Les principaux symptômes des strongles pulmonaires sont la toux sèche puis grasse, l'essoufflement et les troubles respiratoires.

→ Quelle protection pour mes génisses ?

La meilleure protection consiste à développer chez l'animal une immunité par contact régulier et maîtrisé dans des pâturages faiblement infestés. Par exemple, la contamination des pâtures est moindre sur des parcelles préalablement fauchées. Cependant, pour éviter tout préjudice, un traitement en première année est souvent nécessaire. Ne traiter qu'en cas de symptômes des génisses de deuxième année.

→ Foin, enrubannage : remiser les récoltes selon la qualité

Il est recommandé de bien trier les bottes de foin et d'enrubannage en séparant les bons fourrages des médiocres. Les bons lots seront valorisés en priorité par les animaux à forts besoins.



Caroline Cadiou
Stéphanie Montagne